

Ear Infections



REMEMBER YOU CAN CALL 24 HOURS A DAY, SEVEN DAYS A WEEK.

MIDDLE EAR INFECTION

Middle ear infections are deep within the ear. They are most common in young children and often start after a cold. The inner ear tubes get clogged, and bacteria starts to grow.

SYMPTOMS

- Your child's ear hurts. Babies may rub or tug at their ears.
- Your child has a fever and doesn't look or feel well.
- Your child may have difficulty hearing.

WHAT TO DO?

Call your doctor. Antibiotics can help. Treat the pain with ibuprofen or Tylenol®.

OUTER EAR INFECTION ("SWIMMER'S EAR")

Outer ear infections are in the ear canals close to the outside of the ear. They happen when water or dirt gets trapped and bacteria starts to grow.

SYMPTOMS

- Your child's ear hurts worse when your child chews or when your child's earlobe is tugged.
- Your child may say his or her ear feels "full."
- The inside of the ear may look red or puffy.

WHAT TO DO?

Call your doctor. Some doctors will want you to use over-the-counter "swimmer's ear" medicine. Others will want you to use prescription ear drops. Treat the pain with ibuprofen or Tylenol®. Avoid getting water in the ear until the infection is gone.



Community Care of North Carolina

Funding provided by the N.C. Foundation for Advanced Health Programs, Inc.



The Right Call
Every Time.

Your Medical Home.

The Right Call Every Time.
Your Medical Home.

RECUERDE QUE PUEDE LLAMAR LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

INFECCIÓN DEL OÍDO MEDIO

Las infecciones del oído medio ocurren en la profundidad del oído. Éstas son comunes en niños pequeños y frecuentemente se presentan después de una gripe. Los tubos de adentro del oído se tapan y la bacteria empieza a crecer.

SÍNTOMAS

- A su hijo le duele el oído. Los bebés tal vez se soben o se jalen la oreja.
- Su hijo tiene fiebre y no se ve o se siente bien.
- Puede ser que su hijo tenga dificultad para oír.

¿QUÉ HACER?

Llame al doctor. Los antibióticos pueden ayudarle. Trate el dolor con ibuprofen o Tylenol®.

INFECCIÓN DEL OÍDO EXTERIOR (“OÍDO DE NADADOR”)

Las infecciones del oído exterior ocurren en los canales cerca del exterior del oído. Éstas suceden cuando el agua o la mugre se quedan atrapadas, y la bacteria empieza a crecer.

SÍNTOMAS

- A su hijo le duele el oído aún más cuando mastica o se jala la oreja.
- Su hijo puede decir que siente el oído tapado.
- Puede ser que la parte interior del oído se vea roja o hinchada.

¿QUÉ PUEDO HACER?

Llame a su doctor. Algunos doctores le sugerirán que use medicinas que no requieren receta médica y que sirven para curar “el oído de nadador.” Otros doctores van a recetarle unas gotas para el oído. El dolor puede ser tratado con ibuprofen o Tylenol®. Evite la entrada de agua en el oído hasta que la infección esté curada.



Community Care of North Carolina



Siempre La Llamada Correcta.
Su Hogar Médico.

SIEMPRE LA LLAMADA CORRECTA.

SU HOGAR MÉDICO.